



Fuljett ta' Tagħrif dwar il-Ħzieża

X'inhil-ħzieża?

Il-ħzieża hija infezzjoni komuni tal-ġilda li tista' taffettwa l-ġilda u d-dwiefer. L-infezzjoni, li hija kkawżata minn fungus, tissejjaħ "ħzieża (ringworm)" għaliex tista' tikkawża raxx bil-ħakk, aħmar u ċirkolari.

Madwar 40 speċi differenti ta' fungi jistgħu jikkawżaw il-ħzieża. It-tipi differenti ta' ħzieża huma normalment imsemmija għall-parti tal-ġisem fejn tinsab l-infezzjoni. Partijiet tal-ġisem li jistgħu jiġu affettwati mill-ħzieża jinkludu: Is-saqajn (tinea pedis jew "athlete's foot"); l-irqiq ta' bejn il-koxxa u ż-żaqq, in-naħa ta' ġewwa tal-koxox, jew il-warrani (tinea cruris jew "jock itch"); il-qorriegħa (tinea capitis); id-dwiefer tas-swaba' tas-saqajn jew tal-idejn (tinea unguium); partijiet oħra tal-ġisem bħad-dirgħajn jew ir-riglejn (tinea corporis)

Min jista' jiġi infettat bil-ħzieża?

L-infezzjonijiet tal-ħzieża huma komuni ħafna. Jistgħu jaffettwaw lil kulħadd, inkluż persuni li huma b'saħħithom. L-infezzjonijiet tal-ħzieża jistgħu jkunu aktar komuni fost persuni b'sistemi immunitarji soppressi, persuni li jużaw banjijiet komuni, u persuni li huma involuti fi sport ta' kuntatt bħal-lotta. Tifqigħat ta' infezzjonijiet jistgħu jseħħu fi skejjel, djar u ambjenti istituzzjonali.

L-infezzjoni tal-ħzieża li taffettwa l-qorriegħa u x-xagħar, tinea capitis, hija komuni b'mod speċjali fost tfal tal-età tal-iskola u normalment ma toħroġx wara l-pubertà. Tipi oħra ta' infezzjonijiet tal-ħzieża għandhom it-tendenza li jkunu aktar komuni fl-adoloxxenti u l-adulti.


Kif jinfirxu l-infezzjonijiet tal-ħzieża?

Il-ħzieża hija infezzjoni li tittieħed u tista' tinfirex permezz ta' kuntatt dirett mal-ġilda ma' persuna infettata jew billi wieħed imiss animal infettati bil-ħzieża. Ogġetti bħal ħwejjeġ, friex, xugamani, pettnijiet jew xkupilji jistgħu jiġu kontaminati wkoll u jxerrdu l-infezzjoni.

X'inhuma s-sintomi tal-infezzjonijiet tal-ħzieża?

Dawn l-infezzjonijiet normalment iqabbdu l-ħakk u jwasslu għal ħmura, tqaxxir jew qsim tal-ġilda. Ħzieża tal-qorriegħa normalment tibda bħala ponta żgħira li tikber fid-daqs u tħalli rqajja' bil-qoxra ta' tfartis temporanju. Xagħar infettat isir fragli u jinqata' faċilment. Bil-ħzieża tad-dwiefer, id-dwiefer affettwati jsiru aktar ħoxnin, jitolfu l-kulur u jsiru aktar fragli. Il-ħzieża tal-ġisem tidher bħala partijiet ċatti, forma ta' ċirku, li qed jinfirxu. It-tarf huwa ħamrani u jista' jkun xott u bil-qxur jew umdu u bil-qoxra. Meta tinfirex, il-parti ċentrali tiċċara u tidher normali. Il-ħzieża tas-sieq tidher bħala qxur jew qsim tal-ġilda b'mod speċjali bejn is-swaba'.





Ringworm on the back



Ringworm on the arm



Ringworm on the scalp

Meta jibdew jidhru s-sintomi?

Is-sintomi tipikament jidhru bejn 4 u 14-il ġurnata wara esponiment.

Persuna infettata bil-ħzieża ssir immuni?

Ladarba l-ħzieża tista' tiġi kkawżata minn diversi speċijiet ta' fungus, infezzjoni bi speċi waħda ma tagħmilx lil persuna immuni għal infezzjonijiet oħra fil-futur.

Hemm komplikazzjonijiet assoċjati mal-ħzieża?

Huwa rari li infezzjoni fungali tinfirex taħt il-wiċċ tal-ġilda biex tikkawża mard serju. Madankollu, persuni b'sistemi immunitarji dgħajfa jistgħu jsibuha diffiċli li jeħilsu mill-infezzjoni.

Kif jistgħu jiġu trattati infezzjonijiet tal-ħzieża?

It-ttrattament għall-ħzieża jiddependi fuq il-parti tal-ġisem fejn tinsab u kemm hija serja l-infezzjoni. Xi forom ta' ħzieża jistgħu jiġu trattati b'medicini li ma jeħtiġux riċetta tat-tabib ("over-the-counter"), iżda forom oħra ta' ħzieża jeħtiġu trattament b'medicini antifungali li jeħtiġu riċetta tat-tabib.

- **ħzieża fuq il-ġilda** normalment tista' tiġi trattata bi kremi, lozjonijiet, jew terer antifungali li ma jeħtiġux riċetta tat-tabib, applikati fuq il-ġilda għal 2 sa 4 ġimgħat.
- **ħzieża fuq il-qorriegħa** (tinea capitis) normalment teħtiġ li tiġi trattata b'medicini antifungali li jeħtiġu riċetta tat-tabib u li jdumu jittieħdu b'mod orali għal 1 sa 3 xhur. Kremi, lozjonijiet, jew terer ma jaħdmux għal ħzieża fuq il-qorriegħa.

Miżuri li għandek tiegħu jekk jiġi kkonfermat li għandek il-ħzieża

Jekk ġie kkonfermat li inti jew it-tifel/tifla tiegħek ġejtu infettati bil-ħzieża:

- Żomm l-erja affettwata nadifa u xotta.
- Biex tevita li l-infezzjoni tittieħed minn persuni oħra, tużawx xugamani ta' xulxin. Aħsel ix-xugamani, il-lożor u l-ħwejjeg ta' sikwit. Naddaf ix-xawer jew il-banju wara li tużahom. Ipprova tħokk ir-raxx, għaliex dan jista' jferrex il-fungus għal partijiet oħra ta' ġismek.
- Fejn possibbli għandek tarmi jew tiddizinfetta (bil-bliċ) oġġetti li setgħu ġew ikkontaminati bi spori fungali - pereżempju, kpiepel, pettnijiet, imħaded, kutri u imqassijiet. Dan għandu l-għan li jipprevjeni infezzjoni mill-ġdid wara t-ttrattament u biex jiġi evitat li l-infezzjoni tittieħed minn persuni oħra.
- It-tfal xorta waħda jistgħu jmorru l-iskola. Madankollu, biex jiġi żgurat li l-infezzjoni ma tiġix trażmessa lil oħrajn, għandhom isegwu b'attenzjoni t-ttrattament rakkomandat.





Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħha u Prevenzjoni tal-Mard
Dipartiment għar-Regolamentazzjoni tas-Saħha

Uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru u Ministeru għas-Saħha

- Iċċekkja l-qorriegħa jew il-ġilda tat-tfal l-oħra fid-dar. Jekk ikun hemm sinjali ta' ħżieža, fittex parir mediku.
- Jekk ikun issuspettat li s-sors tal-infezzjoni fungali ikun animal domestiku, ikkonsulta veterinarju għal trattament

Jekk tixtieq aktar tagħrif, jekk jogħġbok ikkuntattja t-Taqsima għall--Prevenzjoni u l-Kontroll ta' Mard Infettiv (Infectious Disease Prevention and Control Unit) fuq 23266109, 23266122, 23266119



Health Promotion and Disease Prevention Directorate

Infectious Disease Prevention and Control Unit, 5B, The Emporium, C. De Brocktorff Str., Msida MSD 1421 Malta.
Tel: (+356) 2326 6145, Helpline 21 324 086, Email: disease.surveillance@gov.mt